



நெற்பயிரில் பனிப்பூச்சி,
கபிலநிறத்தத்தி
போஞ்சிப்பயிரில் பனிப்பூச்சி,
வெண் ஈ
உருளைக்கிழங்குப்பயிரில்
பனிப்பூச்சி, வெண் ஈ,
பச்சை அழுக்கனவன்
போன்றவற்றைக்
கட்டுப்படுத்த

ப்ரோவாடோ இமிடகுளோபிரிட்
இமிடகுளோபிரிட் 700 கி./கி.கி. பிளியுஜீ.

ப்ரோவாடோ இமிடகுளோபிரிட்

இமிடகுளோபிரிட் 700 கி./கி.கி. பிளியுஜீ.



Provado™ is the registered trademark of Bayer AG, Germany



ஒருங்கிணைந்த பீடை கட்டுப்பாட்டின் மூலம் பீடைநாசினி பாவனையை குறைக்கவும்

ப்ரோவாடோ இமிடகுளோபிரிட் ஜெர்மனி பாயர் குரோப்சயன்ஸ் நிறுவனத்தின் தொகுதி தொடுகை மூலம் செயற்படும் பூச்சிநாசினியாகும்.

ப்ரோவாடோ இமிடகுளோபிரிட் சிபாரிசு

பயிர்	கட்டுப்படுத்தப்படும் பீடைகள்	கலவை (16 லீற்றர் நீரில்)	16லீ. தெளிகருவியை கொண்டு தெளிக்க வேண்டிய அளவு (ஒரு ஹெக்டயார்)
நெல்	கபிலநிறத்தாவரதத்தி, பனிப்பூச்சி	2.5 கி.	20 - 25
உருளைக்கிழங்கு	பனிப்பூச்சி, வெண் ஈ, கிறின் பீச் அழுக்கணவன்	2.5 கி.	அரம்ப வளர்ச்சி பருவம் 20 - 25
			பிந்திய வளர்ச்சி பருவம் 32 - 38
போஞ்சி	பனிப்பூச்சி, வெண் ஈ	2.5 கி.	அரம்ப வளர்ச்சி பருவம் 20 - 25
			பிந்திய வளர்ச்சி பருவம் 32 - 38
பசுமை பயிர்கள்	பனிப்பூச்சி, அழுக்கணவன், வெண் ஈ	2.5 கி.	20 - 38
பூப்பயிர்கள் ஏனைய அலங்காரத்தா - வரங்கள்	பனிப்பூச்சி,	2.5 கி.	20 - 25
பூசனிக்குடும்ப தாவரங்கள், வெண்டி, கோவா, ராபு, நோகோல்	பனிப்பூச்சி, வெண் ஈ, அழுக்கணவன்	2.5 கி.	20 - 25

அறுவடைக்கு முந்திய கால இடைவெளி : 14 நாட்கள்

ப்ரோவாடோ இமிடகுளோபிரிட் விசிறுவதற்காக 16 லீ. தெளிகருவி பாவிக்கவும். தேனீக்கள் நடமாடும் சந்தர்ப்பங்களில் விசிறுவதை தவிர்க்கவும். பீடைநாசினி விசிறுவதற்கு முன்னர் லேபலை நன்றாக வாசிக்கவும்.



பதிவு
ஹேலிஸ் அக்ரிகல்ச்சர் ஹோல்டிங்ஸ் லிமிட்டெட்,
25, பொஸ்டர் லேன், கொழும்பு 10.
தொ.பேஇல: 0112-688960

பீடை நாசினிகள் ஆபத்தானவை அவதானமாக கையாளவும்.