


වී වගාවේ
තෘණ, පත් වර්ග හා පලල්පත්‍ර
මර්දනයට....

බටදැල්ල, ගොජරවැළ, බජර, මාරුක් හා වෙල්මාරුක්
කුඩමැට්ට, තුනැස්ස, තුන්තිරිය
ඇඹුල් ඇඹිලිය, දිය සියඹලා හා වල් කරාඹ

ප්‍රොක්සි 310

ප්‍රොපතිල් 230ග්‍රෑ/ලී +
ඔක්සඩයසෝන් 80ග්‍රෑ/ලී ඊ.සී.

"C2+E" සේවය සහිත වල්නාශක වීමේ කොලොරන් සඳහා කුඩාමැට්ට යෙදීමෙන් වළක්වන



හෙක්ටයාර 1 ට ලී. 3.5 ලී
(අක්කර 1 ට ලී. 1.4 ලී)

සලකිය යුතුයි: අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව,
කුරුණෑගල, මොණරාගල සහ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ
මහියංගනය, රිදීමාලියද්ද සහ කන්දකැටිය යන
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ තුළ අලෙවි කිරීම හෝ
භාවිතා කිරීම තහනම්

වී වපුරා හෝ පැල සිටුවා
දින 7-12 ත් අතර යොදන්න

ප්‍රොක්සි 310 භාවිතයට උපදෙස්


- යෙදීමට පෙර වල්පැලෑටි හොඳින් මතු වන සේ කුඹුරේ ජලය කඩා හරින්න
- වල්නාශකය යොදා දින 2 - 3 කට පසු නැවත ජලය බැඳ තබන්න
- පස මතුපිට ඔක්සඩයසෝන්, පටලයක් සේ පැතිරීමට පහසු වන පරිදි හොඳින් බිම් සකස් කිරීම අනිවාර්ය වේ. මේ නිසා ප්‍රොක්සි 310 යෙදූ පසු පසේ තෙතමනය ඇති වීම වඩාත් සාර්ථකව වල් මර්දනය වේ
- සෑම විටම සමෝධානික පළිබෝධ මර්දන ක්‍රම අනුගමනය කරන්න
- භාවිතයට පෙර ලේබලයේ ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා අනිවාර්යයෙන්ම පිළිපදින්න

ප්‍රොක්සි 310 භාවිතයෙන් ලැබෙන වාසි

- තෘණ, පත් වර්ග හා පලල්පත්‍ර එකවර මර්දනය වන නිසා කාලය හා ශ්‍රමය ඉතිරි වීම

ප්‍රොක්සි 310 යෙදීමට සුදුසු කාලය

වී වපුරා හෝ පැල සිටුවා
දින 7-12 ත් අතර යොදන්න



- ප්‍රොපතිල් වල ස්පර්ශීය ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මතු වූ වල්පැල මර්දනය වේ
- ඔක්සඩයසෝන් සංස්ථානික හා ස්පර්ශීය යන දෙකාකාරයෙන්ම ක්‍රියාකරන නිසා මතු වූ වල් පැල හා පුරෝහනය වෙමින් පවතින වල් ඒජද මර්දනය කරයි

තෙත් වී වගාවේ තෘණ වර්ග, පත් වර්ග හා පලල්පත්‍ර වල් පැලෑටි මර්දනය සඳහා නිර්දේශිත පූර්ව හා පශ්චාත් නිර්ගමන ක්‍රියාකාරී සංසිද්ධි අඩංගු වල්නාශකයකි. සාන්ද්‍ර තෙලෝද සංයෝගයකි.

| මර්දනය වන වල්පැලෑටි | මිශ්‍රණය | යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය | මිශ්‍රණ ධාරිතාව |
|---|------------------------------|--|---|
| බටදැල්ල, ගොජරවැළ, බජර, මාරුක් හා වෙල්මාරුක් ආදී තෘණ වර්ග කුඩමැට්ට, තුනැස්ස, තුන්තිරිය ආදී පත් වර්ග ඇඹුල් ඇඹිලිය, දිය සියඹලා හා වල් කරාඹ ආදී පලල් පත්‍ර | මී.ලී. 110 ක් ජලය ලීටර් 10 ක | හෙක්.1 ට ලී. 3.5 ක් (අක්.1 ට ලී. 1.4 ක්) | හෙක්.1 ට ලී. 320 ක් (අක්. 1 ට ලී. 128 ක්) |
| වී වපුරා හෝ පැල සිටුවා දින 7-12 ත් අතර යොදන්න. යෙදීමට පෙර වල්පැලෑටි හොඳින් මතු වන සේ කුඹුරේ ජලය කඩා හරින්න. වල්නාශකය යොදා දින 3 කට පසු නැවත ජලය බඳින්න. | | | |
| වැදගත්: මෙම වල්නාශකය යෙදීමට පෙර දින 7 ක් ඇතුළත හෝ යෙදීමෙන් දින 7 ක් ඇතුළත කිසිම විටෙක ඕනෑම රොස්පේට් හෝ කාබමේට් කාණ්ඩයේ කෘමිනාශක හා දිලීරනාශක හෝ රොස්පේට් පොහොර නොයෙදිය යුතුය | | | |



ආයතන අංකය: ROP-IN/VIII/B7
ලිපිනය: හේලිස් ඇග්‍රිකල්ට්ව් හෝල්ඩින්ස් ලිමිටඩ්
400, ඩින්ස් පාර, කොළඹ 10. දුරකථන: 011 268 8960
www.hayleysagriculture.com