

වී වගාවේ ගොජරවාලු ඇතුළු එකවාර්ෂික තෘණ වල මර්දනයට



ටේට්‍රිස්

ක්‍රොෆොක්සිඩිම් 75 ග්‍රෑ/ලී ඊ.සී. අක්කරයට

A මෙම කේතය සහිත වල්නාශක එකම කෙරුණකින් සඳහා අධිණිච්ච යෙදීමෙන් වළකින්න

මෙය පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ අනුමැතිය ලත් විස්තර පත්‍රිකාවකි. අංකය: ROP/L/220720

මිලි ලීටර් 400 ලී තෘණ වලපල වල පත්‍ර 3-5 අවස්ථාවේදී යොදන්න

ටේට්‍රිස් යොදා මර්දනය කලහැකි අනෙකුත් වල්පැලෑටි



අශ්වවලිගය



බජිරි



මාරුක

වරණාත්මක සහ සංස්ථානික ක්‍රියාකාරීත්වයකින් යුත් ACCase කාණ්ඩයට අයත් පශ්චිම නිර්ගමක, පුළුල් පරාසයකින් යුත් වී වගාවේ තෘණ මර්දනයට නිර්දේශිත වල්නාශකයකි. සාන්ද්‍ර තෙලෝදකාරක සංයෝගයකි.

භාවිතය සඳහා නිර්දේශයන්		භාවිතය සඳහා උපදෙස්		
බෝගය	මර්දනය වන වල්පැලෑටි	මිශ්‍රණය	යෙදිය යුතු ප්‍රමාණය	මිශ්‍රණ ධාරිතාව
වී	ඒක වාර්ෂික තෘණ වර්ග ගොජරවාලු අශ්ව වලිගය, මහ මාරුක, බජිරි, හින් මාරුක	මි.ලී. 25-32 ක් පලය ලීටර් 10 ක (මි.ලී. 40-50 ක් පලය ලීටර් 16 ක)	හෙක්ටයාර් 1 ට ලීටර් 1 ක් (අක්කර 1 ට මි.ලී. 400 ක්)	හෙක්ටයාර් 1 ට ලීටර් 320-400 ක් (අක්කර 1 ට ලීටර් 128-160 ක්)

භාවිතය සඳහා උපදෙස්

- මර්දනයට අපහසු ගොජරවාලු මර්දනය වේ (මෙම වල්පැලෑටිය දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල යාපාලු, යාපාලු, කුඩුකෙඩු, හඳුන්කුරු, සෙක්කු සහ දම්ල තාණාවෙන් හෙට්ට්ට්ට්ට්/බ්‍රෝෆ්පාට්ට් යන නම් වලින් හැදින්වේ)
- වී වපුරා හෝ පල සිටුවා ඇති කෙරුණකින් තෘණ වල්පල වල පත්‍ර 3-5 ඇති අවස්ථාවේදී යොදන්න
- යෙදීමෙන් පසු දින 1-2 අතරදී කුඹුරේ වතුර බඳින්න
- වඩා සාර්ථක ප්‍රථම සඳහා පිරිසිදු පලය යොදා මිශ්‍රණය පිලියල කර ගන්න
- අක්කරයකට ලීටර් 16 ටැංකි 8-10 ක් ඉසින්න
- බෝතලයට කෙලින්ම හිරු එළිය වැටෙන සේ ගබඩා කිරීමෙන් වළකින්න
- පත් සහ පළල්පත්‍ර වල් මර්දනය සඳහා නිර්දේශිත වෙනත් වල්නාශකයක් යොදන්න
- සෑම විටම සමෝධානික පළිබෝධ මර්දන ක්‍රම අනුගමනය කරන්න
- භාවිතයට පෙර ලේබලයේ ඇති උපදෙස් හොඳින් කියවා එම උපදෙස් අනිවාර්යයෙන්ම පිලිපදින්න.

පළිබෝධනාශක අනතුරු සහිතයි. ප්‍රවේශයෙන් පරිහරණය කරන්න.